

Bijlage 15. Zorgpad

- Beoordeling op aanwezigheid, positie en angulatie van derde molaren in de onderkaak rond het bereiken van de 17-jarige leeftijd wordt gedaan door de tandarts van de patiënt.
- Indicatiestelling voor het al dan niet verwijderen van de derde molaar vindt plaats door de tandarts van de patiënt en/of door tandarts-specialisten.
- Indien er een indicatie is voor verwijdering van een derde molaar, wordt de verwijdering uitgevoerd door een tandarts die hierin bekwaam is of door een MKA-chirurg. Voor het chirurgisch verwijderen van de derde molaar dient de operateur te voldoen aan de aanbevelingen t.a.v. CH-1 ingrepen in hoofdstuk 11 (Chirurgische ingrepen in de mondholte) van de [KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken \(2016\)](#).
- Vóór verwijderen wordt door de operateur een panoramische rontgenopname gemaakt.
- Indien op de panoramische rontgenopname tekenen van een verhoogd risico op zenuwschade zijn, kan het vervaardigen van een aanvullende CBCT worden overwogen door de operateur.
- De operateur is zelf verantwoordelijk voor de nazorg tot en met 30 dagen na de ingreep. Ook in geval van acute klachten of complicaties na verwijderen van de derde molaar dient beschikbaarheid van nazorg door de operateur georganiseerd te zijn. Bij klachten na 30 dagen kan de patiënt de eigen tandarts consulteren.