

INDICATORENSET: DERDE MOLAAR, D.D. 10-09-2020

Algemeen

Bron	KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020
Doelgroep	Alle patiënten met één of meer aanwezige derde molaren
Betrokkenen ontwikkeling indicatorenset	KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en KIMO Werkgroep Meetinstrumenten; algemene tandarts, mondhygiënist, implantoloog, kaakchirurg, patiëntvertegenwoordiger, methodoloog
Test	Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de mondzorgpraktijk wordt gedaan in de KIMO Test Praktijken.
Tijdperiode	Afgelopen kalenderjaar X
Benodigde praktijkinformatie	<ul style="list-style-type: none">• Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), Paradontoloog (PD)• Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X
Benodigde contextinformatie*	<ul style="list-style-type: none">• Leeftijd en geslacht van de patiënt• Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-cijferige postcode
*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau	

De indicatoren

Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar zijn de volgende drie indicatoren opgesteld, waarbij indicator één is opgedeeld naar 1a en 1b.

No	Indicatoromschrijving
M3-01a	% patiënten bij wie rond hun 17 ^e jaar gedurende een Periodiek Mondonderzoek (PMO) een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3
M3-01b	% patiënten bij wie rond hun 17 ^e jaar gedurende een Periodiek Mondonderzoek (PMO) een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 EN waarbij een gesprek is gevoerd over de voor- en nadelen van een M3 verwijdering
M3-02	% patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen met M3 verwijdering en een ongepland bezoek aan de operateur (tandarts of kaakchirurg) binnen drie maanden na verwijdering

Hierna worden deze indicatoren uitgebreider beschreven in drie aparte tabellen.

Indicator-ID	Beoordeling M3 rond 17 ^{de} jaar
Indicatorcode	M3-01a
Beschrijving	% patiënten bij wie rond hun 17 ^e jaar gedurende een Periodiek Mondonderzoek (PMO) een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3
Teller	Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar, waarbij gedurende een PMO een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3
Noemer	Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	De KPR beschrijft dat het voor patiënten rond hun 17 ^e jaar (16-19 jaar) nodig is een röntgenopname (bitewing) te maken van de M3. Het wordt aanbevolen deze röntgenopname te koppelen aan de reguliere PMO. Aan de hand van de opname kan gezien worden of M3 kan leiden tot een risicocomplicatie en/of aan de patiënt het voorstel gedaan moet worden om (op termijn) tot verwijdering van één of enkele M3 over te gaan.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020
Opmerkingen	
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Tijdigheid, Effectiviteit
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistpraktijk (MP), Gespecialiseerde Praktijk, zoals paradontologie, implantologie (GP)
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheelkundige softwarepakketten voor AP, MP, GP
Gestandaardiseerde registratie en informatiestandaard	Wordt nog uitgezocht
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-cijferige postcode

Indicator-ID	Gesprek bij beoordeling M3 rond 17 ^{de} jaar
Indicatorcode	M3-01b
Beschrijving	% patiënten bij wie rond hun 17 ^e jaar gedurende een Periodiek Mondonderzoek (PMO) een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 EN waarbij een gesprek is gevoerd over de voor- en nadelen van een M3 verwijdering
Teller	Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar, waarbij gedurende een PMO een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 EN waarmee een gesprek is gevoerd over de voor- en nadelen van het verwijderen van M3
Noemer	Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar, waarbij gedurende een PMO een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	De KPR beschrijft dat het voor patiënten rond hun 17 ^e jaar (16-19 jaar) nodig is een röntgenopname (bitewing) te maken van de M3. Het wordt aanbevolen deze röntgenopname te koppelen aan de reguliere PMO. Aan de hand van de opname kan gezien worden of M3 kan leiden tot een risicocomplicatie en/of aan de patiënt het voorstel gedaan moet worden om (op termijn) tot verwijdering van één of enkele M3 over te gaan. Verder wordt aanbevolen om n.a.v. de röntgenopname gelijk het gesprek met de patiënt te voeren over de voor- en nadelen van een eventuele verwijdering van een derde molaar.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020
Opmerkingen	Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alleen een bitewing te maken zonder het gesprek met de patiënt aan te gaan over de voor- en nadelen van een eventuele verwijdering.
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Persoonsgerichtheid
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistpraktijk (MP), Gespecialiseerde Praktijk, zoals paradontologie, implantologie (GP)
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheekkundige softwarepakketten voor AP, MP, GP
Gestandaardiseerde registratie en informatiestandaard	Wordt nog uitgezocht
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-cijferige postcode

Indicator-ID	Complicaties na M3 verwijdering
Indicatorcode	M3-02
Beschrijving	% patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen met M3 verwijdering en een ongepland bezoek aan de operateur (tandarts of kaakchirurg) binnen drie maanden na verwijdering
Teller	Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen, waarbij een M3 is verwijderd en die een ongepland bezoek aan de operateur (tandarts of kaakchirurg) hebben gebracht binnen drie maanden na verwijdering
Noemer	Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen, waarbij een M3 is verwijderd
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Verondersteld wordt dat het ongeplande bezoek aan de operateur (tandarts of kaakchirurg) binnen drie maanden na verwijdering gerelateerd is aan complicaties als gevolg van de verwijdering. Nogmaals het gaat expliciet om de ongeplande bezoeken aan de operateur (tandarts of kaakchirurg).
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020
Opmerkingen	Deze indicator wordt opgenomen in de KIMO indicatorenset. Dit betekent, dat er geen gegevens worden verzameld bij de kaakchirurgen. Het is aan de MKA beroepsgroep om deze indicator ook op te nemen in hun eigen set van kwaliteitsindicatoren.
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit
Type indicator	Uitkomst
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistpraktijk (MP), Gespecialiseerde Praktijk, zoals paradontologie, implantologie (GP)
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheeskundige softwarepakketten voor AP, MP, GP
Gestandaardiseerde registratie en informatiestandaard	Wordt nog uitgezocht
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • Socioeconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-cijferige postcode