

INDICATORENSET: XEROSTOMIE EN HYPOSALIE GERELATEERD AAN MEDICATIE EN POLYFARMACIE, D.D. 17-09-2021

Algemeen

Bron	KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposalie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie , april 2021
Doelgroep	Alle patiënten die medicatie gebruiken met een risico op xerostomie en/of hyposalie als bijwerking. Dit geldt vooral ook als er sprake is van polyfarmacie.
Betrokkenen ontwikkeling indicatorenset	KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en KIMO Werkgroep Meetinstrumenten: algemene tandarts, tandarts-geriatrie, tandarts-gehandicaptenzorg, ziekenhuisapotheker, specialist ouderengeneeskunde, patiëntvertegenwoordiger, methodoloog, Lareb
Test	Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de mondzorgpraktijk wordt onderzoek gedaan in de KIMO Test Praktijken.
Tijdsperiode	Prospectief gedurende een vooraf afgesproken periode
Benodigde praktijkinformatie	<ul style="list-style-type: none"> Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), paradontoloog (PD) Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X
Benodigde contextinformatie*	<ul style="list-style-type: none"> Leeftijd en geslacht van de patiënt ASA score DPSI-score of PPS-score
<i>*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau</i>	

De indicatoren

Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) “Xerostomie en hyposalie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie” zijn de volgende twee indicatoren opgesteld.

No	Indicatoromschrijving
Speeksel-1	Percentage patiënten met verdenking op xerostomie en/of hyposalie, waarbij de speekselsecretiesnelheid in rust en na stimulatie is bepaald
Speeksel-2*	Percentage mondzorgpraktijken dat toegang heeft (elektronische aansluiting) tot medicatieoverzicht van de patiënten.
*Deze indicator wordt nu nog niet meegenomen, omdat dergelijke toegang voor de mondzorgpraktijk nog niet mogelijk is. Zodra dit het geval is adviseert de werkgroep om deze indicator in de set op te nemen.	

Hierna worden de twee opgestelde indicatoren uitgebreider beschreven in aparte tabellen.

Indicator-ID	Bepaling speekselsecretie bij verdenking xerostomie / hypersialie
Indicatorcode	Speeksel-1
Beschrijving	% patiënten met verdenking op xerostomie en/of hyposialie, waarbij de speekselsecretiesnelheid in rust en na stimulatie is bepaald
Teller	Aantal patiënten met verdenking xerostomie en/of hyposialie EN een bepaling van de speekselsecretiesnelheid in rust en na stimulatie
Noemer	Aantal patiënten met verdenking op xerostomie en/of hyposialie
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Met het bepalen van speekselsecretiesnelheid kan het probleem xerostomie en/of hyposialie worden vastgesteld. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van onderdiagnostiek. Bij xerostomie en/of hyposialie wordt in samenspraak met de patiënt preventief beleid ingezet: interval PMO verkleinen, speekselstimulantia of -substituut, tandpasta met 5.000 ppm fluoride en/of overleg voorschrijver.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie, april 2021.
Opmerkingen	Bij het uitvragen van deze indicator is het nodig de samenvatting onder de aandacht te brengen van deze KPR, zodat de mondzorgpraktijk <ul style="list-style-type: none"> • op de hoogte is van de bedoelde medicatielijst; en • aanwijzingen heeft voor het bepalen van speekselsecretiesnelheid en de afkapwaarden. Bepaling speekselsecretiesnelheid kent geen aparte verrichtingencode. Mogelijk dat de code "M32: Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek" hier voor gebruikt kan worden. Dit vraagt nadere afstemming met NZa.
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie, Patiëntgerichtheid
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Mondzorgpraktijk
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Tandheelkundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	<ul style="list-style-type: none"> • Verdenking xerostomie en/of hyposialie door <ul style="list-style-type: none"> ○ Gesprek patiënt ○ Inzicht medicatiegebruik: bepaalde medicatie (zie tabel in KPR) en/of polyfarmacie (gebruik van 5 of meer middelen) • Bepaling speekselsecretiesnelheid moet handmatig worden genoteerd
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad • Leeftijd en geslacht van de patiënt • DPSI of PPS

Indicator-ID	Elektronische toegang medicatieoverzicht patiënten
Indicatorcode	Speeksel-2
Beschrijving	Percentage mondzorgpraktijken dat elektronisch toegang heeft tot het medicatieoverzicht van patiënten
Teller	Aanwezigheid elektronische toegang medicatieoverzicht patiënten
Noemer	
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Deze toegang maakt het mogelijk te beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Het overzicht maakt het mogelijk een gericht gesprek met de patiënt aan te gaan over mogelijke xerostomie en hyposialie.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie, april 2021.
Opmerkingen	
Maataanduiding	Type indicator en niveau van meting
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Persoonsgerichtheid
Type indicator	Structuur
Niveau van meting	Mondzorgpraktijk
Gegevensverzameling	Databron en gegevens
Databron	Praktijkhouder
Registratiewijze, informatiestandaard	Vrije tekst
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	Geen